SET – 1

Series : SSO/C	Code No.
रोल नं.	परीक्षार्थी कोड को उ
Poll No	पर अवश्य लिखे ।

कोड़ नं

त्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 12 हैं ।
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 26 प्रश्न हैं ।
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाहन में 10.15 बजे किया जायेगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
- Please check that this question paper contains 12 printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 26 questions.
- Please write down the Serial Number of the question before attempting it.
- 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक) **CHEMISTRY** (Theory)

निर्धारित समय :3 घंटे 1

। अधिकतम अंक :70

Time allowed: 3 hours 1 [Maximum Marks : 70

सामान्य निर्देश:

- सभी प्रश्न अनिवार्य हैं । (*i*)
- प्रश्न-संख्या $m{1}$ से $m{5}$ तक अति लघ्-उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए $m{1}$ अंक है ।
- (iii) प्रश्न-संख्या 6 से 10 तक लघ्-उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं ।
- (iv) प्रश्न-संख्या 11 से 22 तक भी लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक हैं ।
- प्रश्न-संख्या 23 मुल्याधारित प्रश्न है और इसके लिए 4 अंक हैं । (v)
- (vi) प्रश्न-संख्या 24 से 26 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक हैं ।
- (vii) यदि आवश्यकता हो, तो **लॉग टेबलों** का प्रयोग करें । कैलकुलेटरों के उपयोग की अनुमित **नहीं** है ।

56/1 [P.T.O.


General Instructions:

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) Question number 1 to 5 are very short answer questions and carry 1 mark each.
- (iii) Question number 6 to 10 are short answer questions and carry 2 marks each.
- (iv) Question number 11 to 22 are also short answer questions and carry 3 marks each.
- (v) Question number 23 is a value based question and carry 4 marks.
- (vi) Question number 24 to 26 are long answer questions and carry 5 marks each.
- (vii) Use log tables, if necessary. Use of calculators is **not** allowed.
- 1. AgCl किस प्रकार का स्टोइकियोमीट्री दोष दर्शाता है ?

What type of stoichiometric defect is shown by AgCl?

2. इमल्शन क्या होते हैं ? एक उदाहरण दीजिए ।

What are emulsions? Give an example.



What is meant by chelate effect?

4. निम्न का आई यू पी ए सी (IUPAC) नाम लिखिए :

$$CH_3 - CH_2 - CHO$$

Write the IUPAC name of the following:

$$CH_3 - CH_2 - CHO$$

5. निम्न को क्षारीय क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए :

ऐनिलीन, p-नाइट्रोऐनिलीन और p-टालुइड़ीन

Arrange the following in increasing order of basic strength :

Aniline, p-Nitroaniline and p-Toluidine

56/1

56/1	3 [P.T.C).
	होने वाली अभिक्रियाओं के लिये आयनिक समीकरणों को लिखिए ।	
	पोटैशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का वर्णन कीजिए और इसकी (i) आयोडाइड (ii) H_2S के साथ	
	अथवा	
	अभिक्रिया करता है ? अभिक्रिया के लिये आयनिक समीकरण लिखिए ।	
9.	पोटैशियम परमैंगनेट की निर्माण विधि का वर्णन कीजिए । अम्लीकृत परमैंगनेट ऑक्सैलिक अम्ल के साथ कैसे	
	(ii) NF_3 is an exothermic compound but NCl_3 is an endothermic compound.	
	(i) Nitrogen is much less reactive than phosphorus.	
	Explain the following:	
	(ii) NF_3 एक ऊष्माक्षेपी पदार्थ है परन्तु NCl_3 ऊष्माशोषी पदार्थ है ।	
	(i) फॉस्फोरस की अपेक्षा नाइट्रोजन बहुत कम सक्रिय है ।	
8.	निम्न कथनों की व्याख्या कीजिए :	
	concentration is expressed in mol L^{-1} and time in second.	
	Write units of rate constants for zero order and for the second order reactions if the	
	को mol L ⁻¹ और समय को सेकण्डों में लिखा गया हो ।	
7.	जीरो ऑर्डर और द्वितीय ऑर्डर अभिक्रियाओं के लिये दर स्थिरांकों के यूनिट लिखिए उस स्थिति में जब सांद्रता	
	(ii) Molality of a solution (m)	
	(i) Mole fraction (x)	
	Define the following terms:	
	(ii) एक विलयन की मोललता (m)	
	(i) मोलांश (x)	
6.	निम्न पदों की परिभाषाएँ लिखिये :	

Describe the preparation of potassium permanganate. How does the acidified permanganate solution react with oxalic acid? Write the ionic equations for the reactions.

OR

Describe the oxidising action of potassium dichromate and write the ionic equations for its reaction with (i) an iodide (ii) H_2S .

10. एथैनॉल से एथीन बनने में अम्ल निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए ।

Write the mechanism of acid dehydration of ethanol to yield ethene.

11. सिल्वर fcc जालक में क्रिस्टिलित होता है । यदि यूनिट सेल के कोर की लम्बाई $4.077 \times 10^{-8}~{\rm cm}$ हो, तो सिल्वर का अर्थव्यास (r) परिकिलत कीजिए ।

Silver crystallises in fcc lattice. If edge length of the unit cell is 4.077×10^{-8} cm, then calculate the radius of silver atom.

12. केन-शुगर (M.W. 342) का 5 प्रतिशत घोल (द्रव्यमान आधार पर) एक पदार्थ X के 0.877% घोल के साथ आइसोटोनिक है । X का आणिवक भार परिकलित कीजिए ।

A 5 percent solution (by mass) of cane-sugar (M.W. 342) is isotonic with 0.877% solution of substance X. Find the molecular weight of X.

13. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिये दर स्थिरांक 60 s^{-1} है । अभिकारक के प्रारम्भिक सांद्रण को इसके 1/10 तक घटने में कितना समय लगेगा ?

The rate constant for a first order reaction is 60 s^{-1} . How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its $1/10^{th}$ value?


56/1 4

56/1		5 [P.7	г.о.
		tion in aqueous solutions.	
	Wha	at is meant by 'disproportionation'? Give one example of disproportionation	
16.	'अनान्	नुपातन' से क्या तात्पर्य होता है ? जलीय विलयन में अनानुपातन अभिक्रियाओं का एक उदाहरण दीजिए ।	
	Writ	te the reactions taking place in different zones of the blast furnace to obtain Iron.	
		OR	
	(iii)	What is meant by the term 'chromatography'?	
	(ii)	Differentiate between roasting and calcination.	
	(i)	What is the role of cryolite in the metallurgy of aluminium?	
	Ansv	wer the following:	
	लोहा	बनाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस के विभिन्न भागों में होने वाली अभिक्रियाएँ लिखिए ।	
		अथवा	
	(iii)	'क्रोमैटोग्रैफी' पद से क्या तात्पर्य होता है ?	
	(ii)	भर्जन क्रिया और निस्तापन में अंतर कीजिए ।	
	(i)	ऐलुमिनियम के धातुकर्म में क्राइयोलाइट की क्या भूमिका होती है ?	
15.	निम्न	के उत्तर दीजिए :	
		z K	
	(iii)	Tyndall effect	
	(ii)	Electrophoresis	
	(i)	Dialysis	
	, ,	cribe the following processes:	
	(iii)	टिण्डल प्रभाव	
	(ii)	इलेक्ट्रोफोरेसिस	
	(i)	डायिलिसिस	
14.	निम्न	प्रक्रमों की व्याख्या कीजिए :	

- 17. निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए :
 - (i) $[Co(NH_3)_6]Cl_3$
 - (ii) $[NiCl_4]^{2-}$
 - (iii) $K_3[Fe(CN)_6]$

Write the IUPAC name of the following:

- (i) $[Co(NH_3)_6]Cl_3$
- (ii) $[NiCl_4]^{2-}$
- (iii) $K_3[Fe(CN)_6]$
- 18. निम्न यौगिकों के आई यू पी ए सी (IUPAC) नामों को दीजिए :
 - $\begin{array}{ccc} \text{(i)} & \text{CH}_3 \text{CH} \text{CH}_2 \text{CH}_3 \\ & \text{Br} \end{array}$



(iii)
$$CH_2 = CH - CH_2 - Cl$$

Give the IUPAC names of the following compounds:

 $\begin{array}{ccc} \text{(i)} & \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ & \text{Br} \end{array}$

(iii)
$$CH_2 = CH - CH_2 - Cl$$

56/1 6

- 19. निम्न रूपांतरण कैसे किये जाते हैं ?
 - (i) बेन्जिल क्लोराइड का बेन्जिल ऐल्कोहॉल में
 - (ii) एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रोपेन-1-ऑल में
 - (iii) प्रोपीन को प्रोपेन-2-ऑल में

How are the following conversions carried out?

- (i) Benzyl chloride to Benzyl alcohol
- (ii) Ethyl magnesium chloride to Propan-1-ol
- (iii) Propene to Propan-2-ol
- 20. निम्न अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद लिखिए :

(i)
$$CH_3 - CH_2OH \xrightarrow{PCl_5}$$
?

(ii)
$$OH$$
 + CH_3 - Cl anhyd. $AlCl_3$ Cl

(iii)
$$CH_3 - Cl + CH_3CH_2 - ONa \rightarrow ?$$

Write the major product in the following equations:

(i)
$$CH_3 - CH_2OH \xrightarrow{PCl_5}$$
?

(ii)
$$CH_3$$
 + CH_3 - Cl anhyd. $AlCl_3$?

(iii)
$$CH_3 - Cl + CH_3CH_2 - ONa \rightarrow ?$$

- 21. प्रोटीन से संबन्धित निम्न को परिभाषित कीजिए :
 - (i) पेप्टाइड लिंकेज
 - (ii) प्राइमरी संरचना
 - (iii) डीनैचुरेशन

Define the following as related to proteins:

- (i) Peptide linkage
- (ii) Primary structure
- (iii) Denaturation

7

- 22. 'कोपॉलीमराइजेशन' पद की व्याख्या कीजिए और 'कोपॉलीमराइजेशन' के दो उदाहरण दीजिए ।
 - Explain the term 'copolymerization' and give two examples of copolymerization.
- 23. नीरज डिपार्टमेन्टल स्टोर में घर के सामान खरीदने के लिये गया । एक खाने में वह कुछ शुगररिहत टिकियाँ देखा । वह कुछ ऐसी टिकिया खरीदने का निश्चय किया जो उसके दादा के लिये उपयोगी थी, क्योंकि उसके दादा शुगर के मरीज थे । वहाँ तीन प्रकार की शुगररिहत टिकियाँ थीं । उसने निर्णय किया वह सुक्रोलोस खरीदे जो उसके दादा के लिये उपयोगी थी ।
 - (i) एक अन्य शुगर रहित का नाम दीजिए जो नीरज ने नहीं खरीदा ।
 - (ii) क्या डाक्टर के पर्ची के बिना ऐसी दवा खरीदना नीरज के लिये उचित था ?
 - (iii) उपरोक्त से नीरज का कौन सा गुण प्रतिलक्षित होता है ?

Neeraj went to the departmental store to purchase groceries. On one of the shelves he noticed sugar free tablets. He decided to buy them for his grandfather who was a diabetic. There were three types of sugar free tablets. He decided to buy sucrolose which was good for his grandfather's health.

- (i) Name another sugar free tablet which Neeraj did not purchase.
- (ii) Was it right to purchase such medicines without doctor's prescription?
- (iii) What quality of Neeraj is reflected above?
- 24. $\Delta_r G^\circ$ और e.m.f.(E) को परिकलित कीजिए जो 25 °C पर स्टैंडर्ड स्थिति में निम्न सेल से प्राप्त होता है :

$$Zn(s) \mid Zn^{2+}(aq) \parallel Sn^{2+}(aq) \mid Sn(s)$$

दिया गया :
$$E^{\circ}_{Zn^{2+}/Zn} = -0.76 \text{ V}; E^{\circ}_{Sn^{2+}/Sn} = -0.14 \text{ V}$$

और
$$F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$$

अथवा

56/1 8

- (a) एक विद्युत्-अपघट्य के विलयन के लिये चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए । सांद्रता के साथ उनके परिवर्तन की व्याख्या कीजिए ।
- (b) उस गैलवॉनिक सेल के स्टैंडर्ड सेल विभव को परिकलित कीजिए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है:

$$\mathrm{Fe}^{2+}(\mathrm{aq}) + \mathrm{Ag}^{+}(\mathrm{aq}) \rightarrow \mathrm{Fe}^{3+}(\mathrm{aq}) + \mathrm{Ag}(\mathrm{s})$$

अभिक्रिया का $\Delta_{\mathbf{r}}\mathbf{G}^{\circ}$ और तुल्यांकी स्थिरांक का परिकलन भी कीजिए ।

$$(E^{\circ}_{Ag^{+}/Ag} = 0.80 \text{ V}; E^{\circ}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.77 \text{ V})$$

Calculate $\Delta_r G^\circ$ and e.m.f. (E) that can be obtained from the following cell under the standard conditions at 25 °C :

$$Zn(s) \mid Zn^{2+}(aq) \mid Sn^{2+}(aq) \mid Sn(s)$$

Given:
$$E^{\circ}_{Zn^{2+}/Zn} = -0.76 \text{ V}; E^{\circ}_{Sn^{2+}/Sn} = -0.14 \text{ V}$$

and
$$F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$$
.

OR

- (a) Define conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte. Discuss their variation with concentration.
- (b) Calculate the standard cell potential of the galvanic cell in which the following reaction takes place :

$$Fe^{2+}(aq) + Ag^{+}(aq) \rightarrow Fe^{3+}(aq) + Ag(s)$$

Calculate the $\Delta_r G^{\circ}$ and equilibrium constant of the reaction also.

$$(E^{\circ}_{Ag^{+}/Ag} = 0.80 \text{ V}; E^{\circ}_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.77 \text{ V})$$

			OR
		(iii)	ammonium chloride is treated with Ca(OH) ₂ ?
		(ii)	sulphur dioxide reacts with chlorine in the presence of charcoal?
		(i)	concentrated H ₂ SO ₄ is added to CaF ₂ ?
	(b)	Wha	t happens when
	` /		pared to the corresponding periods of Gr. 15. Why?
	(a)	Elen	nents of Gr. 16 generally show lower value of first ionization enthalpy
		(iii)	XeOF ₄ की संरचना आरेखित कीजिए ।
		(ii)	हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं ?
	. /	(i)	PH3की अपेक्षा NH3 क्यों अधिक क्षारीय होता है ?
	(b)	निम्न	प्रश्नों के उत्तर दीजिए :
		(ii)	XeO ₃
		(i)	BrF ₃
	(a)	निम्नों	की संरचनाएँ आरेखित कीजिए :
			अथवा
		(iii)	अमोनियम क्लोराइड को $\operatorname{Ca(OH)}_2$ के साथ उपचारित किया जाता है ?
		(ii)	सल्फ़र डाइऑक्साइड चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करती है ?
		(i)	सांद्र H_2SO_4 को CaF_2 पर डाला जाता है ?
	(b)	क्या ह	ोता है जब –
		•	में कम मान दर्शाते हैं । ऐसा क्यों है ?
25.	(a)	ग्रुप 1	6 के तत्त्व साधारणतया प्रथम आयनन एन्थैल्पी तत्सम्बन्धी आवर्त वाले ग्रुप 15 के तत्त्वों की

56/1

10

- (a) Draw the structure of the following:
 - (i) BrF₃
 - (ii) XeO₃
- (b) Answer the following:
 - (i) Why is NH_3 more basic than PH_3 ?
 - (ii) Why are halogens strong oxidising agents?
 - (iii) Draw the structure of XeOF₄.
- 26. (a) निम्नों की संरचनाएँ आरेखित कीजिए:
 - (i) p-मेथिलबैंज़एल्डिहाइड
 - (ii) 4-मेथिलपैन्ट-3-ईन-2-ऑन
 - (b) निम्न यौगिक युग्मों में अंतर करने के लिये रासायनिक जाँचों को दीजिए:
 - (i) बेन्ज़ोइक ऐसिड और एथिलबेन्ज़ोएट ।
 - (ii) बेन्जैल्डिहाइड और ऐसीटोफीनोन
 - (iii) फीनॉल और बेन्ज़ोइक ऐसिड

अथवा

- (a) निम्न व्युत्पन्नों की संरचनाएँ आरेखित कीजिए:
 - (i) प्रोपेनोन ऑक्सिम
 - (ii) CH3CHO का सेमीकार्बेजोन
- (b) एथैनॉल को आप निम्न यौगिकों में कैसे रूपांतरित करेंगे ? समबद्ध रासायनिक समीकरणों को दीजिए ।
 - (i) $CH_3 CH_3$
 - (ii) $CH_3 CH CH_2 CHO$ OH
 - (iii) CH₃CH₂OH

- (a) Draw the structures of the following:
 - (i) p-Methylbenzaldehyde
 - (ii) 4-Methylpent-3-en-2-one
- (b) Give chemical tests to distinguish between the following pairs of compounds:
 - (i) Benzoic acid and Ethyl benzoate.
 - (ii) Benzaldehyde and Acetophenone.
 - (iii) Phenol and Benzoic acid.

OR

- (a) Draw the structures of the following derivatives:
 - (i) Propanone oxime
 - (ii) Semicarbazone of CH₃CHO
- (b) How will you convert ethanal into the following compounds? Give the chemical equations involved.
 - (i) $CH_3 CH_3$
 - (ii) $CH_3 CH CH_2 CHO$ OH
 - (iii) CH₃CH₂OH

CHEMISTRY MARKING SCHEME SET -56/1 Compt. July, 2015

Qu es.	Value points	Marks
1	Frenkel defect	1
2	Emulsions are liquid – liquid colloidal systems. For example – milk, cream (or any other one correct example)	1/2 + 1/2
3	Formation of stable complex by polydentate ligand.	1
4	Propanal	1
5	p-Nitroaniline < Aniline < p-Toluidine	1
6	Mole fraction of a component = Number of moles of the component	1
	Total number of moles of all the components ii) Molality (m) is defined as the number of moles of the solute per kilogram (kg) of the	
	Molality (m) = $\frac{\text{Moles of solute}}{\text{Mass of solvent in kg}}$	1
7	Zero order: mol L ⁻¹ s ⁻¹ Second order: L mol ⁻¹ s ⁻¹	1 1
8	 i) Due to high bond dissociation enthalpy of N ≡ N ii) Due to low bond dissociation enthalpy of F₂ than Cl₂ and strong bond formation between N and F 	1 1
9	Potassium permanganate is prepared by fusion of MnO_2 with an alkali metal hydroxide and an oxidising agent like KNO_3 . This produces the dark green K_2MnO_4 which disproportionates in a neutral or acidic solution to give permanganate. $2MnO_2 + 4KOH + O_2 \rightarrow 2K_2MnO_4 + 2H_2O$ $3MnO_4^{2-} + 4H^+ \rightarrow 2MnO_4^{-} + MnO_2 + 2H_2O$	1
	Oxalate ion or oxalic acid is oxidised at 333 K: $5C_{2}O_{4}^{2-} + 2MnO_{4}^{-} + 16H^{+} \longrightarrow 2Mn^{2+} + 8H_{2}O + 10CO_{2}$ OR	1
9	i) Iodine is liberated from potassium iodide: $10I^{-} + 2MnO_{4}^{-} + 16H^{+} \longrightarrow 2Mn^{2+} + 8H_{2}O + 5I_{2}$	1
	ii) Hydrogen sulphide is oxidised, sulphur being precipitated: H ₂ S -> 2H ⁺ + S ²⁻	1
	$5S^{2-} + 2MnO_4^- + 16H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O + 5S$	


10		
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1/2
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1/2
	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1
11	$r = \frac{\sqrt{2}a}{4}$ 1.414 x 4.077 x 10 ⁻⁸ cm	1
	$r = \frac{1.414 \times 4.077 \times 10^{-8} cm}{4}$ $r = 1.44 \times 10^{-8} cm$	1 1
10		
12	$ \pi_{\text{cane sugar}} = \pi_{\text{X}} $	
	Therefore, $c_{\text{cane sugar}} = c_X$ (where c is molar concentration)	
	$\frac{W_{cane \ sugar}}{M_{cane \ sugar}} = \frac{W_X}{M_X}$ $\frac{5 \ g}{M_X} = \frac{0.877}{M_X}$	1
	$\frac{5 g}{342 g mol^{-1}} = \frac{0.877}{M_X}$	1
	$M_{\rm X} = \frac{0.877 \times 342}{5} \rm gmol^{-1}$	
	$M_{X=}$ 59.9 or 60 gmol ⁻¹	1
13	$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[R]_0}{[R]}$	1
	$60 \text{ s}^{-1} = \frac{2.303}{t} \log \frac{[R]_0}{\frac{[R]_0}{10}}$	
	$t = \frac{2.303}{60 s^{-1}} \log 10$	1
	$t = \frac{2.303}{60}$ s	
	t = 0.0384 s	1
14	i) It is a process of removing the dissolved substance from a colloidal solution by means	1
	of diffusion through a semi - permeable membrane. ii) The movement of colloidal particles under an applied electric potential towards	1
	oppositely charged electrode is called electrophoresis.	

	iii)	Colloidal particles scatter light in all direct		
15	i)	illuminates the path of beam in the colloid. It lowers the melting point of alumina / ac	•	1 1
	ii)	Doogting	Calcination	1
		Roasting Ore is heated in a regular supply of air	Heating in a limited supply or	1
		ore is neared in a regular supply of an	absence of air.	
	•••	(Or with equation)		
	iii)	It is a process of separation of different coradsorbed on a suitable adsorbent.	mponents of a mixture which are differently	1
			OR	
15		+ CO →2Fe ₃ O ₄ +CO ₂		$6 \times \frac{1}{2}$ = 3
	(Iron or	c) CO→3FeO +CO₂		- 3
		→ CaO +CO ₂		
	(Limesto		44,	
	CaO + S	$SiO_2 \rightarrow CaSiO_3$ (Slag)		
	FeO + C	$CO \rightarrow Fe + CO_2$		
	C + CO ₂	→ 2CO	B(.671)	
	Coke C + O ₂ -	CO.	1.5	
	FeO +	C . Fo . CO	correct equations)	
16	Dispropor		element undergoes self-oxidation and self-	1 1/2
	reduction	simultaneously. For example –	& A	1 1/2
	2Cu ⁺ (aq)	\rightarrow Cu ²⁺ (aq) + Cu(s)	04	1 /2
	(Or any o	ther correct equation)	,5	
17	i)	Hexaamminecobalt(III) chloride	2,	1
	ii)	Tetrachlorido nickelate(II)		1 1
	iii)	Potassium hexacyanoferrate(III)		
18	i)	2-bromobutane		1
	ii)	1, 3-dibromobenzene		1
	iii)	3-choloropropene		1
19		CH ₂ Cl CH ₂ ON	a CH2 OH	1
		+ NaOH -	H ⁺	
	:)	-HCI		
	i)	UCUO	r 100k	
		CH₃CH₂MgCl HCHO CH₃-CH₂-C	CH₂-OH	1
	ii)	H ₂ O		

	**	•
	$CH_3CH = CH_2 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3 - CH - CH_3$	
	OH	1
		1
20	PCl₅ :、 CH₃-CH2OH ——→ CH₃CH2Cl	1
	1)	
	ii)	
	ОН ОН ОН	1
	Applyed AICI CH ₃	1
	$+ CH_3Cl \xrightarrow{Anhyd. AlCl_3} + CH_3$	
	iii) CH ₃	
	CH₃Cl + CH₃CH₂-ONa → CH₃CH₂-O-CH₃	
		1
21	i) Peptide linkage – in proteins, ∝-amino acids are connected to each other by peptide bond or peptide linkage (- CONH-bond).	1
	ii) Primary structure - each polypeptide in a protein molecule having amino acids which	1
	are linked with each other in a specific sequence.	
	iii) Denaturation - When a protein is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH, protein loses its biological activity.	1
22	Copolymerisation is a polymerisation reaction in which a mixture of more than one monomeric	1
	species is allowed to polymerise and form a copolymer.	
	CH = CH ₂	
		1
	$n CH_2 = CH - CH = CH_2 + CH_2 - CH - CH_2 - CH - CH_2$	
	1, 3-Butadiene Styrene Butadiene - styrene copolymer	
	CN C	1
	$n CH_2=CH-CH=CH_2+nCH_2=CH \xrightarrow{Copolymerisation} CH_2-CH=CH-CH_2-CH_2-CH_2$	1
	1,3-Butadiene Acrylonitrile Buna-N	
23	i) Aspartame, Saccharin (any one) (or any other correct example)	1
23	ii) No	1
	iii) Social concern, empathy, concern, social awareness (any 2)	2
24	E^{0} cell = $E^{0}_{Sn2+/Sn}$ - $E^{0}_{Zn2+/Zn}$ = -0.14V -(-0.76V)	1
	= -0.14 V - (-0.76 V) = 0.62 V	1
	$\Delta_{\rm r} { m G}^0 = -{ m n} \ { m F} \ { m E}^0_{\rm cell}$	1
	= - 2 x 96500 C mol ⁻¹ x 0.62 V = - 119660 J mol ⁻¹	1
	— - 117000 J IIIOI	1

		1
	$E_{\text{cell}} = E_{\text{cell}}^0 - \frac{0.059}{n} \log \frac{[Zn^{2+}]}{[Sn^{2+}]}$	
	$E_{\text{cell}} = 0.62 - \frac{0.059}{2} \log \frac{[Zn^{2+}]}{[Sn^{2+}]}$	
	OR	1
24	a) The conductivity of a solution at any given concentration is the conductance of one unit	
	volume of solution kept between two platinum electrodes with unit area of cross section	1/2
	and at a distance of unit length.	, 2
	Molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of the volume	1/2
	V of solution containing one mole of electrolyte kept between two electrodes with area of	/ 2
	cross section A and distance of unit length.	
	Molar conductivity increases with decrease in concentration.	1
	World conductivity increases with decrease in concentration.	1
	$b)E^0cell = E^0_C - E^0_A$	
	= 0.80V - 0.77V	1/2
	= 0.03 V	1/2
	$\Delta_{\rm r} { m G}^0 = -{ m n} \ { m F} \ { m E}^0_{ m cell}$	72
	$= -1 \times 96500 \text{ C mol}^{-1} \times 0.03 \text{ V}$	1
	$= -2895 \text{ J mol}^{-1}$	1
		1/
	$\text{Log } K_c = \frac{n E_{cell}^o}{0.059}$	1/2
	$\text{Log K}_{c} = \frac{1 \times 0.03}{0.059}$	1/
	$Log K_c = 0.508$	1/2
25	a) Due to relatively stable half – filled p-orbitals of group 15 elements	2
23	b) i) $CaF_2 + H2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2HF$	$\begin{vmatrix} 2 \\ 1 \end{vmatrix}$
		1
	$SO_2(g) + CI_2(g) \rightarrow SO_2CI_2(l)$	1
	$\begin{array}{l} \mathrm{SO_2(g)} + \mathrm{Cl_2} \ (g) \rightarrow \mathrm{SO_2Cl_2(l)} \\ \mathrm{iii)} \ 2\mathrm{NH_4Cl} + \mathrm{Ca(OH)_2} \rightarrow 2\mathrm{NH_3} + 2\mathrm{H_2O} + \mathrm{CaCl_2} \end{array}$	1
	OR	
25	a) i)	
	F	
	Br F	
	· Bi · ·	1
		1
	ii)	
	Xe	
		1
		1
	b) i)Due to small size of nitrogen, the lone pair of electron on nitrogen is localized/easily	1
	, ,	1

	available for donation.	
	ii)Because they need only one electron to attain stable/noble gas configuration.	1
	Xe	
		1
	iii)	
26	a) i)	
	ÇНО	
		1
	ĊH₃	
	ii)	
	(CH ₃) ₂ C=CHCOCH ₃	1
	b) i)Add NaHCO ₃ , benzoic acid will give brisk effervescence of CO ₂ whereas ethylbenzoate	1
	will not.	
	ii)Add NaOH and I ₂ , acetophonone forms yellow ppt of iodoform on heating whereas benzaldehyde will not.	1
	iii)Add neutral FeCl ₃ , phenol gives violet colouration whereas benzoic acid does not.	1
	OR (or any other correct test)	
26	a) i)	
	CH₃	1
	CH ₃ C=N-OH	
	ii) CU-	
	CH3 I	
	C=N-NH -C-NH ₂	1
	H ²	
	b) i)	
	Zn-Hg	1
	CH₃CHO ———→ CH₃-CH₃	1
	conc HCl	
	ii)	
	2 CH ₃ -CHO ← CH ₃ -CH-CH ₂ -CHO	
		1
	ÓН	



Dr. Sangeeta Bhatia

Sh. S.K. Munjal

Sh. D.A. Mishra

